

Sélectionnez le pays dans le menu déroulant

Colombia

COL

Basé sur les données disponibles les plus récentes.

Version 2.02.

2024


Production (couverture)

Résultat (utilisation/comportement du service)

Impact

Nouvelles infections à VIH

(tendance chez les 15 ans et plus par rapport aux objectifs 2020 et 2025)



Niveau de référence 2010

2020, 2022

Objectif 2020

Objectif 2025

Les objectifs 2020 et 2025 représentent la contribution requise du pays aux objectifs mondiaux, à savoir une réduction de 75 % d'ici à 2020 et de 82,5 % d'ici à 2025 par rapport à 2010 comme niveau de référence.

Prévention basée sur le traitement antirétroviral

Score composite PrEP (0-10)	0	% des besoins nationaux en PrEP satisfaits	Toutes pop.	6
Nombre de personnes ayant reçu la PrEP au moins une fois au cours des 12 derniers mois	6670	% de PVVIH avec une charge virale supprimée	Femmes 15+	0
% de personnes vivant avec le HIV sous TAR	id		Hommes 15+	0

Populations clés

Prévalence du VIH

Professionnel(le)s du sexe (PS)

Estimation de la taille de la population des professionnel(le)s du sexe	336700	Utilisation du préservatif /dernier rapport sexuel rémunéré (%)	PS	id	PS <25 ans	id
% de PS ayant reçu au moins deux interventions de prévention du VIH (3 derniers mois)	90		Hommes 15-49	85	PS de tous âges	id
Stratégie de prévention comprenant des éléments essentiels de la prévention (PS)	< Moitié	% sous TAR	PS VVIH	79		

Hommes gays et autres hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes (HSH)

Estimation de la taille de la population des HSH	id	Utilisation du préservatif /dernier sexe anal (%)	HSH	id	HSH <25 ans	id
% de HSH ayant reçu au moins deux interventions de prévention du VIH (3 derniers mois)	14	% sous TAR	HSH VVIH	85	HSH tous âges	id
Stratégie de prévention comprenant des éléments essentiels de la prévention (HSH)	< Moitié					

Consommateurs de drogues injectables (CDI)

Estimation de la taille de la population des consommateurs de drogues injectables	id	% avec des pratiques d'injection sûres	CDI	id	CDI <25 ans	id
% des CDI qui ont reçu au moins deux interventions de prévention du VIH (3 derniers mois)	42	% suivant traitement de substitution aux opiacés		id	CDI de tous âges	id
Stratégie de prévention comprenant les éléments essentiels de réduction des risques (CDI)	< Moitié	% sous TAR	CDI VIHV	65		

Obstacles et facilitateurs structurels

Criminalisation du travail du sexe	Oui	% de personne qui évitent les soins en raison de la stigmatisation et de la discrimination	PS	id
Criminalisation des relations homosexuelles	Non		HSH	id
Criminalisation de l'usage de drogues ou de la possession de drogue pour usage personnel	#N/A		CDI	id
Criminalisation des personnes transgenres	Non		P. transgenres	id

Résumé des résultats

PS	9
HSH	id
CDI	3
TAR	id
PrEP	0.1

Femmes 15-24 0.1

Hommes 15–24 0.1  
Adultes, 15+ 0.6

0

Abréviations: na ... sans objet ;

PVVIH...personnes vivant avec le VIH; LHIV...vivant avec le VIH; JF...jeunes femmes; JH...jeunes hommes;

SSR ... Santé sexuelle et reproductive

Très bon

Bon

Moyen

Faible

Très faible

id Données insuffisantes